

ADEX®

Indapamide 2,5 mg

FORME ET PRESENTATION :

Comprimé à 2,5 mg d'Indapamide : blister Alu-Alu

Boîte de 30 comprimés

COMPOSITION :

Chaque comprimé contient :

Indapamide2,5 mg

Lactose monohydraté 82,75 mg

Excipients : Carboxyméthylamidon sodique (Type A), Stéarate de magnésium q.s.p un comprimé.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Hypertension artérielle essentielle.

CLASSE PHARMACOLOGIQUE :

- Antihypertenseur diurétique (C : système cardiovasculaire).

CONTRE INDICATIONS :

- Hypersensibilité aux sulfamides.
- Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).
- Encéphalopathie hépatique.
- Hypokaliémie.

MISES EN GARDE :

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. La survenue d'une telle encéphalopathie impose l'arrêt immédiat du traitement et la correction d'une éventuelle hypokaliémie.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Un contrôle régulier, d'autant plus fréquent que le sujet est à risque, est indispensable pour :

- La natrémie, qui doit être contrôlée avant la mise en route du traitement,
- La Kaliémie : pour laquelle un premier contrôle doit être effectué au cours de la semaine qui suit la mise en route du traitement.

Grossesse et allaitement :

- Les diurétiques thiazidiques et apparentés sont contre-indiqués chez la femme enceinte et ne peuvent constituer le traitement des œdèmes physiologiques de la grossesse (risque d'hypotrophie fœtale).

- L'allaitement est déconseillé.

Conducteurs et utilisateurs de machines :

Des réactions individuelles en relation avec une baisse de la pression artérielle peuvent survenir chez certains patients.

Par conséquent, l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines peut être diminuée.

Sportifs :

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Vous devez informer votre médecin des médicaments que vous prenez déjà régulièrement ou épisodiquement, y compris ceux délivrés sans ordonnance.

EFFETS INDESIRABLES :

- Risque d'hyponatrémie avec hypovolémie à l'origine d'une déshydratation et d'une hypotension orthostatique, voire d'un syndrome confusionnel.
- Risque de déplétion potassique avec hypokaliémie, notamment chez le cirrhotique, le sujet âgé, dénutri, polymédiqué, le coronarien et l'insuffisant cardiaque. Il peut entraîner des troubles du rythme sévères, en particulier des torsades de pointes (pouvant être mortelle), notamment chez l'insuffisant cardiaque.
- Troubles biologiques supplémentaires : hyperuricémie, hyperglycémie, exceptionnellement : hypercalcémie.
- Troubles neurologiques (rares) : vertige, asthénie, paresthésie, céphalée.
- Troubles digestifs : (rares) nausée, constipation, (exceptionnellement) pancréatite.
- Troubles hématologiques (exceptionnels) : thrombopénie, leucopénie, agranulocytose, aplasie médullaire, anémie hémolytique.
- Divers : réactions d'hypersensibilité essentiellement dermatologiques, éruption maculopapuleuse, purpura, risque d'aggravation d'un lupus érythémateux aigu disséminé préexistant, sécheresse buccale.

POSEOLOGIE :

1 comprimé par jour, de préférence le matin.

CONDITIONS DE DELIVRANCE :

LISTE II

PRECAUTIONS POUR LA CONSERVATION :

A conserver au dessous de 25°C , à l'abri de la lumière et de la chaleur.

PRESENTATION :

Boîte de 30 comprimés - N° d'A.M.M : 923 326 1

Ceci est un médicament.

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Le médicament est un produit qui affecte votre santé, et sa consommation contraire aux instructions est dangereuse pour vous.
- Suivez strictement la prescription du médecin, la méthode d'utilisation, et les instructions du pharmacien qui vous a dispensé le médicament.
- Le médecin et le pharmacien sont experts en médicaments, ses bienfaits et ses risques.
- N'interrompez pas de vous-même la période du traitement qui vous a été prescrit.
- Ne répétez pas la même prescription sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de portée des enfants

أداكس[®]

أندباميد 2.5 مغ

الشكل والتقديم :

قرص 2.5 مغ أندباميد علبة ذات 30 قرص.

التركيب الدوائي :

كل حبة تحتوي على :

أندباميد 2.5 مغ

لاكتوز مونوهيدرات 82.75 مغ

السواغات : كربوكسيميثيللاميدون الصوديوم (صنف أ)، ستيرات المانيزيوم : كمية كافية لقرص واحد .

دواعي الاستعمال :

- ارتفاع الضَّغَط الشَّرْيَانِي الرَّئِيسِي .

القسم العلاجي :

- مضاد للضَّغَط المرتفع المدرُّ للبول (س : الجهاز القلبي الوعائي) .

تضادات الاستعمال :

- التحسس الشَّدِيد تجاه السِّلْفَامِيد .

- قصور كلوي حاد (تصفية الكرياتينين > 30 مل / دقيقة) .

- مرض دماغي مكبود .

- هيپوكالميا .

تحذير :

في حالة الإصابة الكبدية قد تسبب مدرّات البول التزايدية والانتسابية في مرض دماغي مكبود. إن الإصابة بمرض دماغي تحتمّ الوقف

الفوري للعلاج والبداة بهيپوكالميا .

احتياطات الاستعمال :

إن المراقبة الدائمة ضرورية في الحالات التالية :

- التآثرية يجب أن تكون مراقبة قبل بداية العلاج .

- الكالميا : يجب اجراء مراقبة أولية خلال الأسبوع الذي يلي البداة في العلاج .

- الحمل والإرضاع :

يجب أن يتمّ تقادي تناول مدرّات البول التزايدية والانتسابية لدى المرأة الحامل (امكانية حدوث هيپوتروفيا جنينية) .

من المرغوب تجنب الرضاعة .

بالنسبة للسائقين ومستعملي الآلات :

قد تظهر لدى بعض المرضى تفاعلات ذات صلة بهيپو الضَّغَط الشَّرْيَانِي، وعلى هذا الأساس تقلّ قدرة هؤلاء على قيادة العريات واستعمال الآلات .

بالنسبة للرياضيين :

يجب لفت انتباه الرياضيين الى أنّ هذا الدواء يحتوي على مادّة فعّالة بإمكانها ان تنتج ردّ فعل ايجابي أثناء اختبارات تعاطي المنشطات .

التفاعلات الدوائية :

يجب اعلام الطبيب عن الأدوية التي تتناولها بصورة دائمة أو دورية بما فيها تلك التي يقع اقتناؤها بدون وصفة .

الأعراض الجانبية :

- خطر الإصابة بالهيپوناتريميا مع الهيپوفوليميا وتكون مصدر تجفيف ونقص في التوتّر الوقوفي وتصل الى الإصابة بفيروس خبلي .

- خطر الافراج البوتاسي مع الهيپوكالميا خصوصا لدى المصابين بتليّف الكبد والتمتدّمين في السن ومختلّ التَغذية والبوليميديك والمصاب بقصور

قلبي . وقد ينتج اضطرابات حادة وخاصة التورصادات الحادة (قد تكون قاتلة) وتكون بصورة حصرية عند مريض القلب .

- اضطرابات عصبية (نادرة) تشوُّش الحس، الصداع .

- اضطرابات بيولوجية اضافية : الأيريسيميا المفرطة، تحلون الدّم المفرط واستثائيا : التكلّس المفرط للدّم .

- اضطرابات هضمية : (نادرة) غثيان، قيض، (استثائيا) التهاب المعقد .

- اضطرابات دموية (استثائيا) : تروبوبينيا، قلة الكريضات، أفرنيلوسيتوز توقف النموّ النّخاعي، فقر الدّم .

- تأثيرات أخرى : ردود فعل تحسّسية جلدية، طفح بشري، بقع حمراء على الجلد ، خطر استفحال القرّاض الحمامي الحاد، جفاف الحلق .

المقادير :

قرص واحد في اليوم ومن المستحسن في الصّباح .

الصرف :

قائمة II

الحفظ :

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25 درجة بعيدا عن الضّوء والرطوبة .

التقديم :

علبة تحتوي على 30 قرصا، رقم التأشيرة : 1 923 326

إنّ هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات .
- الدواء مستحضر يؤثّر على صحتك وإستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها .
- تقيد بتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك . فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تعد ، ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب .

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .



NO0003
V02

مخابر مديس ش.خ.إ.

طريق نابل كم 7 - ص ب 206 - 8000 نابل - تونس

الهاتف: 006 235 72 (216) - الفاكس: 006 235 72 (216)