

MEDIPREX 10 mg Comprimé pellicule sécable Escitalopram

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pouvez avoir besoin de la consulter.
* Si vous avez eu d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
* Ce médicament vous est personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.
* Si l'un de vos effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice

- Qu'est-ce que MEDIPREX 10 mg, comprimé pellicule sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MEDIPREX 10 mg, comprimé pellicule sécable ?
- Quels sont les effets indésirables possibles ?
- Comment conserver MEDIPREX 10 mg, comprimé pellicule sécable ?
- Quelles sont les précautions d'emploi ?
- Comment conserver MEDIPREX 10 mg, comprimé pellicule sécable ?
- Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE MEDIPREX 10 mg, comprimé pellicule sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
Classe pharmacothérapeutique
MEDIPREX contient la substance active escitalopram. L'escitalopram appartient à un groupe d'antidépresseurs appelés inhibiteurs sélectifs du réupteur de la sérotonine (ISRS). Ces médicaments agissent sur le système sérotoninergique dans le cerveau en augmentant le taux de sérotonine. Les dysfonctionnements du système sérotoninergique sont considérés comme un facteur important dans le développement de la dépression et des pathologies associées.

- * Traitement des épisodes dépressifs majeurs (C.A.D caractérisés) et des épisodes de troubles obsessionnels compulsifs.
- * Traitement du trouble anxieux social (phobie sociale).
- * Traitement du trouble anxieux généralisé.
- * Traitement des troubles obsessionnels compulsifs.
- Environ deux semaines peuvent être nécessaires avant que vous ne commenciez à vous sentir mieux. Continuez à prendre MEDIPREX même si vous tardez à ressentir une amélioration.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MEDIPREX 10 mg, comprimé pellicule sécable ?

- * **Si vous prenez MEDIPREX dans les cas suivants :**
 - si vous êtes allergique à l'escitalopram ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (listés dans les annexes 1 et 2).
 - si vous prenez d'autres médicaments appartenant à la famille des inhibiteurs de la MAO, dont la sélégriline (utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson), le moclobémide (utilisé dans le traitement de la dépression) et le linéolidé (un antioxydant).
 - si vous êtes diabétique. Un traitement par MEDIPREX peut déséquilibrer votre glycémie. Une adaptation des doses est parfois nécessaire et pourra être effectuée.
 - si vous avez une quantité de sodium dans le sang diminuée.
 - si vous avez déjà eu des troubles cardiaques ou si vous prenez un traitement par électrochoque.
 - si vous présentez une maladie coronarienne.
 - si vous avez eu des troubles cardiaques ou si vous avez eu récemment une crise cardiaque.
 - si vous avez un rythme cardiaque lent au repos et/ou si vous savez que vous avez un risque de carence en sel suite à une diarrhée ou des vomissements sévères et prolongés ou à la prise de traitements diurétiques.
 - si vous avez eu des troubles cardiaques ou des évanouissements, des malaises ou des sensations de vertiges lors du passage à la position debout qui pourraient indiquer un fonctionnement anormal du rythme cardiaque.
 - si vous avez eu ou avez déjà eu des problèmes aux yeux, comme certains types de glaucome (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil).

3. Comment prendre MEDIPREX 10 mg, comprimé pellicule sécable ?

Prenez votre médicament à l'heure indiquée par votre médecin. Vous pouvez le prendre avec ou sans nourriture. Prenez votre médicament avec un verre d'eau. Prenez votre médicament à l'heure indiquée par votre médecin. Vous pouvez le prendre avec ou sans nourriture. Prenez votre médicament avec un verre d'eau. Prenez votre médicament à l'heure indiquée par votre médecin. Vous pouvez le prendre avec ou sans nourriture. Prenez votre médicament avec un verre d'eau.

4. Quels sont les effets indésirables possibles ?
Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
Les effets indésirables s'estompent habituellement après quelques semaines de traitement. Sachez que certains de ces effets peuvent aussi être des symptômes liés à votre maladie qui s'améliorent ainsi quand vous commencez à vous sentir mieux. Si vous ressentez les effets indésirables suivants, vous devez contacter votre médecin ou aller immédiatement à l'hôpital :
• Difficultés respiratoires (peut concerner jusqu'à 1 patient sur 100).
• Saignements anormaux, incluant saignements gastro-intestinaux.
Rarement (peut concerner jusqu'à 1 patient sur 1000) :
• Difficultés respiratoires (peut concerner jusqu'à 1 patient sur 100) ou si vous avez des difficultés à respirer ou à avaler (réaction allergique).
• Fièvre, une agitation, confusion, des tremblements et des contractions soudaines des muscles, ce peut être le signe d'un état rare, appelé syndrome sérotoninergique.
Fréquence indéterminée (fréquence ne pouvant pas être estimée à partir des données disponibles) :
• Convulsions (crises convulsives), voir également rubrique «Avertissements et précautions».

5. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES LES PLUS GRAVES ?

- * Un jaunissement de la peau et du blanc de l'œil sont les signes d'un mauvais fonctionnement du foie d'une hépatite.
- * Douleurs cardiaques (angor, crise cardiaque) ou douleurs articulaires (arthralgies et myalgies).
- * Troubles sexuels (éjaculation retardée, troubles de l'érection, baisse de la libido, troubles de l'orgasme chez la femme).
- * Prise de poids.
- * Fréquence indéterminée (peut concerner jusqu'à 1 patient sur 100) :
• Évanouissements, vertiges, évanouissements (prunt).
- * Fréquence de dents, agitation, nervosité, attaques de panique, confusion.
- * Troubles du sommeil, troubles du goût, malaise (syndrome).
- * Pupille surannée (mydriase), troubles de l'audition, bourdonnements d'oreilles (acoupiques).
- * Perte de cheveux.
- * Saignements anormaux, incluant saignements gastro-intestinaux.
- * Perte de poids.
- * Difficultés respiratoires cardiaques.
- * Gonflement des bras ou des jambes.
- * Saignements de nez.
- * Fréquence indéterminée (fréquence ne pouvant pas être estimée à partir des données disponibles) :
• Diminution de la quantité de sodium dans le sang (des symptômes sont un « mal de cœur » - nausées - et sensation de malaise).
- * Sensations vertigineuses lors du passage à la position debout, dues à une chute de la pression artérielle (hypotension orthostatique).

- * Particularités des tests hépatiques (augmentation des concentrations sanguines des enzymes hépatiques).
- * Mouvements anormaux (mouvements involontaires).
- * Érections douloureuses (priapisme).
- * Évanouissements et saignements notamment au niveau de la peau et des muqueuses (ecchymoses). Gonflement soudain de la peau ou des muqueuses (angioedème).
- * Gonflement du tissu d'érection urinaire (sécrétion inappropriée d'ADH).
- * Écoulement de lait chez l'homme et du lait chez la femme.
- * Mante.
- * Une augmentation du risque de fractures osseuses a été observée chez les patients prenant ce type de médicaments.
- * Trouble du rythme cardiaque (appelé «allongement de l'intervalle QT»), observé à l'ECG, un examen qui mesure l'activité électrique du cœur.
- * Un effet certain nombre d'effets indésirables sont connus pour survenir avec des médicaments agissant de la même façon que l'escitalopram (la substance active de MEDIPREX). Il s'agit de :
• Agitation nocturne (akathisie).
- * Fréquence indéterminée (fréquence ne pouvant pas être estimée à partir des données disponibles) :
• Aggressivité, dépersonnalisation, hallucinations.
- * Ralentissement du rythme cardiaque.
- * Fréquence indéterminée (fréquence ne pouvant pas être estimée à partir des données disponibles) :
• Diminution de la quantité de sodium dans le sang (des symptômes sont un « mal de cœur » - nausées - et sensation de malaise).
- * Sensations vertigineuses lors du passage à la position debout, dues à une chute de la pression artérielle (hypotension orthostatique).

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contient MEDIPREX 10 mg, comprimé pellicule sécable ?

Tenir hors de la portée de la main et des enfants.
Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Informations supplémentaires

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur ce médicament en consultant le site internet de votre pharmacien.

Précaution d'emploi

Escitalopram (sous forme d'oxalate) 10 mg (1/27 mg)

Colloïde microcristallin. Silice colloïdale anhydre. Talc. Croscarmellose sodium. Stéarate de magnésium. Opadry Blanc (polyvinyl alcool, titanium dioxide, polyéthylène glycol / macrogol, talc).

Qu'est-ce que MEDIPREX 10 mg et contenu de l'emballage extérieur :

• Boîte de 30 comprimés enrobés de cellulose.
MEDIPREX est disponible en boîte de 15 comprimés et en boîte de 30 comprimés.

A.M.N. N° : Liste 1 - Tableau A
Titulaire de l'A.M.M. de référence : Laboratoires Médiprex

Les Laboratoires Médiprex B.P. 206 - 8000 Nabeul - Tunisie
Tel : +216 72 235 006 / Fax : +216 72 235 016 / E-mail : contact@labomed.com

La date de fabrication et la date d'expiration de ce médicament sont indiquées sur la boîte.

Précaution d'emploi

Escitalopram (sous forme d'oxalate) 10 mg (1/27 mg)

Colloïde microcristallin. Silice colloïdale anhydre. Talc. Croscarmellose sodium. Stéarate de magnésium. Opadry Blanc (polyvinyl alcool, titanium dioxide, polyéthylène glycol / macrogol, talc).

Qu'est-ce que MEDIPREX 10 mg et contenu de l'emballage extérieur :

• Boîte de 30 comprimés enrobés de cellulose.
MEDIPREX est disponible en boîte de 15 comprimés et en boîte de 30 comprimés.

A.M.N. N° : Liste 1 - Tableau A
Titulaire de l'A.M.M. de référence : Laboratoires Médiprex

Les Laboratoires Médiprex B.P. 206 - 8000 Nabeul - Tunisie
Tel : +216 72 235 006 / Fax : +216 72 235 016 / E-mail : contact@labomed.com

La date de fabrication et la date d'expiration de ce médicament sont indiquées sur la boîte.

