MP<sup>®</sup>40, MP<sup>®</sup>500 Powder for injection Methylprednisolone sodium succinate

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Kyou have any futther questions, ask your doctor or pharmacist.
- Hyou have any futther questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been precincled for you. Do not pass it on to other may have futther the same as yours.
- Haw you the sale effects pets serons, or if you notice are you defletts not listed in this leaflet, please full your doctor or pharmacist. In this leaflet

is leaflet:
What MP is and what it is used for
Before you take MP
How you take MP
Possible side effects
How to store MP
Further information

## 1 What MP is and what it is used for?

I. What MPs and what it is used for?

Pharmacother-appetit group:
MP contains Methylpredinisolone Sodium Succinate. Methylpredinisolone belongs to a group of medicines called corticoster (sternds), Corticosteroids are produced naturally in your body and are important for many body functions. Generally, and the state of the produced naturally in your body and are important for many body functions. Booming your body with extra corticosteroid such as MP can help following surgery (e.g. organ transplants), flare-ups of the symptons of multiple sclerosis or of the stressful conditions. These include unflammatory or aller pic conditions affecting the Plant named by a tumouf or mensing of "ulcerative colitis".

Plant named by a tumouf or mensing of "ulcerative colitis".

Lungs caused by stylina, severe allergy or hypersensitivity, tuberculosis or breathing in (aspirating) vount or stomach contents. Similer g. Steven-ic-Johnson Syndroids or than those listed above.

MP may be prescribed to treat conditions other than those listed above.

Before worm facts WP.

MP may be prescribed to treat conditions other than those listed above.

Ask your doctor if you are unsaw thy you have been given this medicine.

2. Before you take MP:

2. Do not take MP it or suffered an allergic reaction, or any other type of reaction after being given MP or any other medicine, containing a corticosteroid or any of the ingredients in this medicine (Section 6 of this leaflet contains a list of ingredients). An allergic reaction may cause a six may are containing a corticosteroid or any of the ingredients in this medicine (Section 6 of this leaflet contains a list of ingredients). An allergic reaction may cause a six may are citation.

You have rejectely laid, or are about to have any vaccination.

You have rejectely laid, or are about to have any vaccination.

You have rejectely laid, or are about to have any vaccination.

The special care with APP:

See your doctor immediately if any of the above applies to you.

The special care with APP:

Our doctor mix have be monitor your treatment more closely, alter your dose or give you another medicine.

Your factor may have be monitor your treatment more closely, alter your dose or give you another medicine.

Chickempor, measles, shangles or a hepse eye infection. If you thinky you have been in contact with someone with chackengor, measles or shangles and you have not already had these illnesses, or if you are unsure contact with someone with chackengor, measles or shangles and you have not already had these illnesses, or if you are unsure contact with someone with every of the settles of the section of the

Joint infection.

Kaposi's sagrooma (a type of skin cancer).

Kidney of liver disease

Muscle problems (pain or weakness) have happened while taking steroid medicines in the past.

Myasthenia gravis (a condition causing tired and weak muscles).

Octoporous's (brille boues).

If you are administ to morphism on any location are included in the medicine and how many injections you will receive depent the condition being treated and its severity. Your doctor will inject you with the lowest dose for the rehel of your symptoms the condition being treated and its severity. Your doctor will inject you with the lowest dose for the rehel of your symptoms.

the condition being treated and its severity. Your doctor will inject you with the lowest dose for the ristle of your symptoms. Adults
MP will be given as an injection by your doctor, either into a vein (intravenous) or into a muscle (intramuscular).
Unailly the first done is given into a vein, especially in an emergency.
Unailly the first done is given into a vein, especially in an emergency.
The medicane is first done is given into a vein, especially in an emergency.
The medicane is first dissolved in Steine Water for Injections. If the medicine is to be given by infusion (using a pump or drip) it is then mixed with another suitable fluid.
No other medicines should be mixed with it.
Elderly
Elderly
Elderly end will normally be the same as for younger adults. However your doctor may want to see you more regularly regularly to elsewhere was me entire on with this medicine.

then mixed with another guidale mixed.

Heavy Control with a control with it.

Treatment will normally be the same as for younger adults. However your doctor may want to see you more regularly regularly to check how you are getting on with this medicine.

Corticoteroids can affect growth in children so your doctor will prescribe the lowest dose that will be effective for your child. Do not drait agreeful juice with being treated with MP.

To you have the control with the control with MP.

To you have the control with the control with MP.

To you have the control with the control with MP.

To you have the children with the control with MP.

To you do you have the control with the control with MP.

To you have the children with the control with t

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor, health care provider or paarmaeisx.

4. Possible side effects

Lake all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Your doctor will lawe green you this medicine for a condition which if not treated properly could become serious In certain medical conditions medicines like MPI (steroidy) should not be stopped abruptly. They use suffer from any of the following symptoms seek IMMEDIATE medicial attention. Your doctor will It you suffer from any of the following symptoms seek IMMEDIATE medical attention. Your doctor will see the sufference of the sufferenc

to the infection, so that they are hard to diagnose at an early stage.
Symptoms might include a raised temperature and feeling unwell. Symptoms of a flare up of a previous TB infection could be coughing blood or pan in the chest. Symptoms of a previous malaria infection could involve childs and fever.
MP may also make you more likely to develop a severe infection.
\*Pulmonary embolits (blood clots in the lung), symptoms include sudden sharp chest pain, breathlessness and coughing on the coughing up those.

coughing up blood.

\*Raised pressure within the skull of children (pseudotumour cerebri) symptoms of which are headaches with vomitting, lack of energy and drowsmess. This side-effect usually occurs after treatment is stopped.

"Thrombophlebus (blood clots or thormboss) in a leg veni, symptoms of which include painful swollen, red and tender

"Thrombophlebus" (blood clots or thormboss) in a leg veni, symptoms of which include painful swollen, red and tender

veins. If you experience any of the following side effects, or notice any other unusual effects not mentioned in this leaflet,

If you experience any of the following side effects, or notice any outer unusual cut tell your doctor straight away.

The side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:

- common. affects is to 10 users in 100

- not known. frequency cannot be estimated from the available data.

Blood, heart and circulation

\* High blood pressure, symptoms of which are headaches, or generally feeling unwell.
\* Problems with the pumping of your heart (heart failure) symptoms of which are swollen ankles, difficulty in breathing and palpitations (awareness of heart beat) or irregular beating of the heart, irregular or very fast or slow puise.
\* Low blood pressure symptoms may include diazaness, fainting, lightheadedness, blurred vision, a rapid, or irregular heartbest (aplatitations), general weakness.
\* Increased numbers of white blood cells (leucocytosis).
Body water and salts

BODY MATER THAN MATER AND MATER

common
• High blood pressure, symptoms of which are headaches, or generally feeling unwell.

Ulcers.
 Not known
 Nausea (feeling sick) or vomiting (being sick).
 Diarrhoea.

Diarrhoea.
Thrush in the gullet (discomfort on swallowing)
Indigestion.
 Bloated stomach.
 Abdominal pain.
 Hiceywe

Hiccups.
 Ears
 Not known

A feeling of dizziness or spinning (vertigo).

Not known

\*\*Glaucoma (raised pressure within the eye, cauxing pain in the eyes and headaches).

\*\*Swollen opts never (papilloedems, indicated by sight disturbance).

\*\*Thinmag of the clear part at the front of the eye (comea) or of the white part of the eye (sclera).

\*\*Protruding of the eyeballs (exophthalmos).

\*\*General disorders\*\*

\*\*General disorders\*\*

Poor wound healing

Not known
Feeling tired or unwell.
Skin reactions at the site of injection.
Hormones and metabolic system
Commones

ommon Slowing of normal growth in infants, children and adolescents which may be permanent Round or moon-shaped face (Cushingoid facies).

Nound o'r moon-shiped face (Cushingoid facies).
Not known
Irregular or no periods in women.
Irregular or no periods in women.
Increased appetite and weight gain.
Increased appetite and weight gain to be compared to the control of cracking diabetes.
Increased appetite and cracking diabetes.
Increased appetite and cracking diabetes.
In a mount of certain chemicals (enzymes) called alanine transaminase, aspartate transaminase and alkaline phosphatases that help the body digest drugs and other substances in your body may be raised after treatment with a corticosteroid. The change is usually small and the enzyme levels return to normal after your medicine has cleared naturally from your system. You will not notice any symptoms if this happens, but it will show up if you have a blood test.
Common 1

Common
• Increased susceptibility to infections not known

Suppression of reactions to skin tests, such as that for tuberculosis Muscles and bones

Common Brittle bones (bones that break easily). Muscle weakness

• Muscle weatness
not known
• Muscle wasting.
• Muscle wasting.
• Throken bones or finatures.
• Breakdown of bone dues to poor circulation of blood, this causes pain in the hip.
• Breakdown of bone dues to poor circulation of blood, this causes pain in the hip.
• Muscle cramps or spasms

mmon proids including methylprednisolone can cause serious mental health problems. sese are common in both adults and children. They can affect about 5 in every 100 people taking medicines like

Steroids including methylprednisolone can cause serious mental health problems.
These are common in both adults and children. They can affect about 5 in every 100 people taking medicines lake methylprednisolone.
Feeling depressed, including thinking about suicide.
Feeling depressed, including thinking about suicide.
Feeling and one of the control of

ommon
Acne.
Bruising
Thinning of skin (skin atrophy).
not known

- Britisang
- Thinning of skin (skin atrophy)
- Thinning of skin (skin atrophy)
- Thinning of skin (skin atrophy)
- Stretch marks (skin strae)
- Pale or darker patches on your skin, or raised patches which are an unusual color.
- Pale or darker patches only our skin stretch str

6. Eurther information:

a "What MP contains:

The active ingredient of MP do is Methylprednisolone sodium succinate. One vial contains 50.69 mg Methylprednisolone Sodium Succinate, elequivalent to 40 mg Methylprednisolone. Sodium succinate of the Sodium Succinate Sodium Succinate, elequivalent of MP 500 mg Methylprednisolone sodium succinate. One vial contains 633.6 mg Methylprednisolone Sodium Succinate. One vial contains 633.6 mg Methylprednisolone Sodium Succinate Sodium Succinate (equivalent to Somio Methylprednisolone).

The other ingredients of MP 500 are monosodium phosphate, disodium phosphate, disodium phosphate, elequivalent sodium Succinate Sodium Sodium

c- Marketing Authorization Holder and Manufacturer: LES LABORATOIRES MEDIS- S.A.

LES LABORATOTRES MEDIS- S.A.
Route de Tunis- KM 7- BP 206 - 8000 Nabeul - Tunisie
Tel (216) 722 35 006 Fax: (216) 722 35 106
E-mail: marketing ventes@medis com tu
a- This leaflet was last revised in "May 2015"; version number "00"
b- To report any side effect(s):

Please contact the relevant competent authority. c- Council of Arab Health Ministers

This is a Medicament

 Medicament is a product which affects have lost a Medicament
 Surely the doctor's prescription, the method of use and the instruction.
 Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instruction.
 The doctor and the planuments we seeper its numbout to its benefits and risks a bound of the planument of the properties numbout to be suffer and risks.
 Do not by vousuel instructure the period of treatment prescribed for you.
 Do not repeat the same prescription unduston consulting your doctor.
 Keep all insedicaments out of reach of children. n contrary to instructions is dangerous for you ions of the pharmacist who sold the medicament.

. Council of Arab Health Minist Union of Arab Pharmacists

V00192 Médis

```
م ب 500 , م ب40 م بـ 40 مسعوق للحقن
مسعوق للحقن
ميثيل بريننيز ولون سكسينات الصوديو
           الشر أو التخفر في وريد السائق)، وتشمل أم راضه الام وقرم و إمصرار الأوردق.
بالنبية التالية، الإنجفات أي أمر أصل حالية، أكثرى غير محالة أخير مشكورة بهذا الشرة، فأغير طبيبك فور ا
بشبت لكل ار متقاونة، ويقم تعرفها كالتالي.
سنتخدا
                                                                                                                                م وأعراضه هي الصداع أو الشعور بالتوعك العام.
                                                                                                                                                                                                                                                                           يدنيز و لون سكسينات الصو ديوم. الميثيل بر يدنيز و لون ينتمي لمجموعة من الأدوية تسمى الستر و يدات
ج الستر ويدات القسرية بشكل طبيعي داخل جمسك و هي مهمة للحديد من الوظائف الحيوية داخل الجمم.
                     ين قليك (قصور حضلة القلب) وأعراضها تررم الكاحل وضيق في التنفس والخففان (الشعور بضربات القلب)
لب أو حدر التقام البحن أوسر حته الفائقة أو بطله.
بن ضغط الدم الدول أو الدوخة أو الروبة الصبابية أو تسارع أو اختلال ضربات القلب (الخففان) أو ضعف عام.
                                                                                                                                                                                                                                                                         يد من السترويدات القشرية مثل م بفي مرجلة ما بعد العمليات الجراحية (مثل: زراعة الأعضاء)
التصليب المتعدد إلى الحالات المرضية المرفقة الأخرى.
لحساسية التي 125 في:
                                                                                                                                                                                                                                                                             " أنسحاباً.
شكل " "موض كر ور" و "التهاب القولون التقريحي"
مساسية الحادة أو الحساسية المفرطة أو الدرن أو الشفط الرئوي (شرقان) للقيء أو محتويات المعدة.
                                                                                                                  النائجان عن ارتفاع نسبة الماء والأملاح في الجسم
بسبب فقدان الجسم للبوتام يوم. في بعض الحالات الدائرة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بقصور القلب الاحتفاقي (عندما لا يتمكن
كن القلب من ضغ الدم بشكل سليم).
                                                                                                                                                                                                                                                                               ن ساول هذا الدواء:
جر جنك أو ( واطائك دواء آخر
التي أو هر بين العين. إن كنت تُعكّد أنك تواصلت مع شخص مصاب بالجديري
اب من قبل بتلك الأمر أض، أو إن كنت غير متأكد ألك قد أصبت بهم.
                                                                                                                                                                                                                                                                            ن الاكتتابي أو اضطر اب دو اتجاهين). يشمل ذلك الإصناية بالاكتتاب في وقت سابق أثناء
د كاريخ مرضي للعائلة بالإصناية بهذا الإمراض.
للعائلة بالإصناية بمرض الشكري
                                                                                                                                          ضاء (الكتاركت) ( يشير إليهاحدوث تدهور الإبصار).
                                                                                                                                                                                                                                                                             الراتج (التهاب جدار الأمداء) أو مشتكل خطيرة أخرى بالمحدة أوالأمداء.
مشتكل الأوردة اللقجة عن المختر (جلطات في الأوردة) تسبب القهاب الأوردة (أوردة حمراء متورمة مؤلمة).
بالمترن في وقت سابق.
```

مع اختبار ات الجلد، مثل: فحص الدرن.

الم (يمكن أن تتكسر العظام بسهولة).

يونيل برينيز ولون يمكنها أن تسبب مشكل صحية ذهلية خطيرة. هذه الآثار الجانبية شامة في كل من البالغين والأطفال. إلا تسبة 9/8 من مستخصى أدوية علل: ميثيل برينيز ولون. أف الشاكير في الأنتخر: و العزاج المسالم صديرة اهو طا.

به المعتبر عن ارتفاقه. العزاج المتكلف صعودا و هبوطا. رأى وصعوبة التقدير أو الشعور بالارتباك وفقتان الذاكرة. ياء غير موجودة واقعبا. التفكير في أفكار غريبة أو مرعبة و تحول السلوك أو الشعور بالوحدة.

. على حيث على جلنك أو يقع بارزة ذات لون غير معتاد. الجسم والوجه.

خاتبية خطيرة، أو إذا لاحظت أي أعراض جانبية غير واردة في هذه النشرة، يرجى إخبار طبيبك أو مقدم الرعاية

جة حرارة أقل من °25مئوية. ناريخ الصلاحية المركون على الملصق و العلية الكارتونية (EXP). يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في

الماء المعقر للحقن، فيجب استخدام المحلول على القور . يجب التخلص بشكل أمن من أية سوائل غير مستخدمة. المحلول قد تغير قرنه أو يحتري على شوائب. في مصدر في الميدة أو القمامة المنزلية. اسال الصبطلي عن كوفية التخلص من الأموية التي لم تحد

ب: هم ميقيل بر يدنيز ولون ساتصيفات الصوديوم. تحتوي الفار ورة الواحدة على 60.69 مجم من ميثيل بريدنيز ولون 40 مجم من ميثيل بريدنيز ولون). 40 همي : الموسفات أحدي الصوديوم تشائي الهنر جة،و الفوسفات تشائي الصوديوم دوديكا ميدرات واللاتكنوز أحدي يشل برينيز ولون ساكسينك الصوديوم. تحتوي القارورة الواحدة على 633.6 مجم من ميشل برينيزولون مهم من منيشل برينيز ولون) مجم هي: القوسفات أحادي الصوديوم تناشي الهدرجة، والقوسفات ثناشي الصوديوم دوديكاهيدرات وهيدروكسيد

رقية (ضعف وظائف الغدة الدرقية). . ومة كابوزي (نوع من سرطان الجلد).

بد. ضلات (إلّم أو ضعف) أثناء تناول أنوبة السّرويدات في السابق. بيل (حالة نسبب إر هاق وضعف العضلات).

مكلات غذائية: كما ان الأوراد أنه في الطريقة الله على الما و ب أو الله تعمل بها الأورية الأخرى، فيجب طبك إخبار طبيك. تقدم لمحار المثان أنها والمساري المسارية تقدم لمحار المثان المواجئة في المواجئة المسارية المسارية المسارية المسارية المسارية المسارية المسارية المسارية لذي يرخي الوفرة المصلية لوبيان إطريق حصلي) مثل: يستحدين، ونيوستيجين.

هذر تنظيف صعص سج. شأن الأيهزور في المستخدم لعلاج الأم الخفيف إلى المعتدل, يريمينون مستخدوا لعلاج الصرع المعرضة المعربة وحسر العضم الخمض. المفصل الرعادي العداء أو الصليفة العائدة، أو يعد زراعة أعد لدغائل الرعادي العداء أو الصليفة العائدة، أو يعد زراعة أعد لدغائل الرعادي العداء أو الصليفة العائدة، أو يعد زراعة أعد لعمضي. :فية الحادة، أو بعد زراعة أعضاء، أو بعد زراعة نخاع العظم.

تخدم لعلاج الدرن لم لقط الجسم المحمد العزروع. فتراً أو كنت على وشك تلقى الله تطميعات. يجب الا تنتقى للمتحلت الفيروسات الحية فتراً أو كنت على وشك تلقى الله تعلقها رُى أَقُلُّ تَشَيِّرٍ ا أَوَّ الصَّنِيِّ إِنَّ كَنْتَ تَتَنَاوِلُ أَوْ تَتَاوِلْتَ مَوْخَرِ ا أَيَّة أَنْوِيةَ أَخْرَى بِمَا فِي ذَلْك العَقَافِيرِ

هويل. كري أو ارتفاع ضغط الدم أو احتباس الماء (التورم أو الوذمة)، أخير طبيبك حيث إنه قد يحتاج لتحديل جرعة مر طبيبك أو طبيب أسنانك أو طبيب التخدير باتك تتناول م ب. لدى طبيبك أو في المستشفى، فمن المهم أن تخير الطبيب أنك تتناول م ب. فهذا الدواء يمكنه أن يؤثر في نتائج بعض

غير مرغوبة، مثل: الدوخة والدوار، والاضطرابات البصرية، والإرهاق بعد العلاج السترويدات ة أن تشغل الله

يسمى لاكتوز. أنواع السكر، تواصل مع طبيبك قبل تناول هذا المنتج الدوائي.

فتها بخلق مصمه سرير... في الإربية (برديد) أي في الحدث (حصنية). "" عند 4 أكان الشير علت الإنكر 30 نقيقة تويز يديجب استخدام الغير علت الإنكر عادة لمدة ليومن "" عند 4 أكان الشير علت الإنكر 30 نقيقة تويز يديجب ستخدام الغير علت الإنكر عادة لمدة ليومن

س للحقن. إذا كان الدواء سيتم حقنه بالتسريب الوريدي (باستخدام مضخة أو بالتنقيط)، لهجب أن يمزج

اه البالغون. وعلى الرغم من ذلك فقد يرغب طبيبك في رؤيتك بشكل أكثر انتظاما للتأكد من مدى استجابتك لهذا الدواء وُثِر في محل نمو الأطفال، لذا سيصف طبيبك لطفلك أقل جرعة من شائها أن تكون فعالة. \* الآلام القرار المسلمان المسلم

ة تزيد على 3 أسابيم. منا ، حتى وإن كان كلك لمدة 3 أسابيع أو أقل. الشرية خلال العام الساطني، أو لديك مشاكل بالفعل في خنتك الكظرية (قصور الغدة الكظرية)

ابيه. لأن الأنف ولزوجة العين والنعرق وفقدان الوزن. عا ُ بالنز امن مع تخفيض جر عنك من الدواء.

ية أثناء تناول السترويدات مثل: م ب (انظر أيضا الفقرة 4 الأحراض الجانبية المحتملة).

ب في حِدوث أثار جانبية، رخم أن ذلك لا يحدث في كل الحالات. سيصف لك طبيبك هذا الدواء لعلاج حالة