

# Mexine®

## Cimétidine

**Forme pharmaceutique :**

Ampoule de solution injectable de 2 ml.

**Composition :**

Cimétidine (DCI) base ..... 200 mg  
Excipient : acide chlorhydrique concentré q.s.p. pH 4,9, eau pour préparations injectables q.s.p ..... 2 ml.

**Propriétés :**

La cimétidine est un antagoniste des récepteurs H2 de l'histamine.

**Sort du médicament :**

La cimétidine administrée par voie parentérale présente une demi-vie d'environ 2 heures. L'élimination se fait essentiellement par voie rénale, 70% de la dose administrée sont retrouvés dans les urines en grande partie non métabolisés.

**Indications :**

- Ulcère gastrique et duodéal évolutif.
- Hémorragie de la maladie ulcéreuse (à l'exclusion des hémorragies par ulcération artérielle).
- Ulcères anastomotiques.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.
- Ulcères gastroduodénaux liés au stress.
- Ulcères gastroduodénaux d'origine médicamenteuse.
- Traitement de l'œsophagite secondaire au reflux gastro-œsophagien.

**Contre indication :**

- Hypersensibilité connue à la cimétidine.
- Grossesse et allaitement.

**Effets indésirables :**

- Quelques cas de diarrhée, douleurs musculaires, étourdissements, éruptions cutanées, états fébriles, ont été signalés.
- Une élévation transitoire des transaminases, réversible à l'arrêt du traitement, et une augmentation légère de la créatininémie ont été observées.
- Des gynécomasties et galactorrhées.

**Mode d'emploi :**

L'injection IM est possible. Elle peut être transitoirement douloureuse.

La perfusion IV est à utiliser de préférence.

**Posologie :**

Adultes : la posologie habituelle est de 800mg à 1600mg (4 à 8 ampoules à 200mg) par jour. Ce traitement peut être poursuivi durant 7 jours par voie injectable, la suite du traitement étant assuré par voie orale.

Enfants :

- Nouveaux nés : 10 à 15mg/kg/jour.
- Moins de 1 an : 20mg /kg/jour.
- De 1 à 12 ans 20 à 25mg/kg/jour.

**Surdosage :**

Des cas de surdosage à des doses allant jusqu'à 20g de cimétidine ont été rapportés sans conséquences graves.

Il existe cependant un risque de crises convulsives. Emétiques et lavage gastrique associés à un traitement symptomatique peuvent être justifiés.

**Délivrance :**

Liste II (Tableau C)

Sous ordonnance médicale.

**Présentation :**

Officinale : Boîte de 10 Ampoules injectables de 2 ml AMM N° 923 316 1

Hospitalier : Boîte de 50 Ampoules injectables de 2 ml AMM N°923 316 2H

**Ceci est un médicament.**

- Le médicament est un produit qui affecte votre santé et sa consommation contraire aux instructions est dangereuse pour vous.
- Suivez strictement la prescription du médecin, la méthode d'utilisation et les instructions du pharmacien qui vous a dispensé le médicament.
- Le médecin et le pharmacien sont experts en médicaments, ses bienfaits et ses risques.
- N'interrompez pas de vous-même la période du traitement qui vous a été prescrit.
- Ne répétez pas la même prescription sans consulter votre médecin

**Gardez les médicaments hors de portée des enfants**

Les laboratoires des Médicaments Stériles S.A.  
Route de Nabeul - Km7 - BP 206 - 8000 Nabeul - Tunisie  
Tél : (216) 72 210 591 Fax : (216) 72 235 106



Code N00015  
Y03

# ميكسين<sup>®</sup>

## سيميتيدين

**الشكل :**

حياية محلول للحقن 2 مل.

**التركيبية :**

- سيميتيدين ..... 200 مغ

- حامض الكلوريدرات المركز 4,9 PH

- ماء لتحضير الحقن كمية كافية لـ ..... 2 مل

**الخصائص :**

سيميتيدين مضاد لمستقبلات الهستامين من النوع الثاني يكون نصف حياته عند إعطائه عن طريق الحقن ساعتان تقريبا ويتم إطراحه بشكل رئيسي في البول، 70٪ منها توجد بشكل غير متغير في البول

**دواعي الاستعمال :**

- التقرح المعدي والإثنا عشري المتطور
- النزيف المنجر عن التقرح (ما عدى النزيف الناتج عن التقرح الشرياني)
- التقرح الأستوموزي
- أعراض زولينجر - إليسون
- التقرح المعدي والإثنا عشري الناتج عن الاكتئاب
- التقرح المعدي والأثنا عشري الناتج عن استعمال الأدوية
- إصابة المريء الثانوية أو الإرتجاع المعدي المريئي.

**مضادات الاستعمال :**

- الحساسية المعروفة للسيميتيدين
- عند الحمل والرضاعة

**تأثيرات غير مرغوب فيها :**

- بعض حالات الاسهال - الاوجاع العضلية - التهيجات الجلدية - حمى خفيفة.
- الإرتفاع الانتقالي للعناصر فوق الأيونية وكذلك الزيادة الطفيفة في كريات الدم.
- إنشخاخ الثديين عند الذكور - إدرار الحليب بغزارة.

**طريقة الاستعمال والمقادير :**

- طريقة الاستعمال : حقن في العضلات أو حقن في الوريد.

- المقادير :

\* الكهول : المقادير العادية تتراوح بين 800 مغ و1600 مغ (4 إلى 8 حقن ذات 200 مغ)

يمكن مواصلة الدواء مدة 7 أيام عن طريق الحقن

\* الأطفال :

- المواليد الجدد : 10 مغ إلى 15 مغ / كغ / يوم

- أقل من سنة : 20 مغ / كغ / يوم

- من 1 إلى 12 سنة : 20 مغ إلى 25 مغ / كغ / يوم

**الأفراط بالمقادير :**

سجلت حالات عديدة من الزيادة المفرطة في المقادير حتى 20 غ من السيميتيدين دون ملاحظة أو تسجيل نتائج خطيرة على أنه يوجد خطر حدوث أزمات تشنجية.

**طريقة الصرف :**

قائمة II (جدول ج)

يصرف بوصفة طبية

**التقديم :**

الصيديات علبية تحتوي على 10 حيايات 2 مل تأشيرة رقم 1 923 316

المستشفيات علبية تحتوي على 50 حياية 2 مل تأشيرة رقم 2H 923 316

### إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها.
- تقيد بتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك. فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغي وضرها.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تعد، ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

**لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.**

مخابر الأدوية المعتمدة ش.خ.إ.

طريق نابل كم 7 ص ب 206 - 8000 نابل - تونس

الهاتف : 923 316 210 (216) - الفاكس : 923 316 235 (216)

Médis